

# FASTAC® 11

Berkesan Mengawal Koya  
有效控制粉蚧



**BASF**

We create chemistry

# FASTAC® 11

Berkesan Mengawal Koya  
有效控制粉蚧

**FASTAC® 11** ialah sejenis racun serangga bukan sistemik yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan 'pyrethroid' yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

使用法：根据1974年农药法令，不遵照标签使用是违法的。

| TANAMAN<br>农作物区 | SERANGGA<br>PEROSAK<br>害虫   | KADAR RACUN 用药量        |                 | ISI PADU<br>SEMBURAN<br>SEHEKTAR<br>每公顷喷液量 | BILANGAN<br>SEMBURAN<br>MAKSIMUM<br>最高喷射次数 |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|--|--|
|                 |   | 10 LITER AIR<br>10 公升水 | SEHEKTAR<br>每公顷 |  |  |
| Padi<br>稻米      | Ulat Gulung Daun<br>捲叶虫<br>( <i>Cnaphalocrosis medinalis</i> )                  | 6 ml<br>毫升             | 150 ml<br>毫升    | 250 liter<br>公升                            | 4 kali<br>semusim<br>每季4次                  |
|                 | Piandang<br>长脚蚊<br>( <i>Leptocorisa oratorius</i> )                             |                        |                 |  |  |
|                 | Bena Hijau<br>叶面跳蚤<br>( <i>Nephotettix virescens</i> )                          |                        |                 |  |  |
|                 | Kutu Beruang<br>黑蟪象<br>( <i>Scotinophora coarctata</i> )                        |                        |                 |  |  |
|                 | Ulat Pengorek Batang<br>蛀莖螟虫<br>( <i>Chilo suppressalis</i> )                   |                        |                 |  |  |
|                 | Ulat Pucuk/<br>Berengga Pusaran Padi<br>蛀顶芽虫<br>( <i>Hydrellia philippina</i> ) |                        |                 |  |  |
| Tembakau<br>烟草  | Ulat Ratus<br>行军虫<br>( <i>Spodoptera litura</i> )                               | 7 ml<br>毫升             | 315 ml<br>毫升    | 450 liter<br>公升                            | 4 kali<br>semusim<br>每季4次                  |
| Sawit<br>油棕     | Ulat Beluncas<br>食叶毛虫<br>( <i>Thosea asigna</i> ,<br><i>Setora nitens</i> )     | 3 ml<br>毫升             | 90 ml<br>毫升     | 300 liter<br>公升                            | 14 kali<br>setahun<br>每年14次                |
| Koko<br>可可      | Kepinding Nyamuk<br>可可青蚊<br>( <i>Helopeltis theobromae</i> )                    | 5 ml 毫升                | 100 ml 毫升       | 200 liter<br>公升                            | 14 kali<br>setahun<br>每年14次                |
| Durian<br>榴蓮    | Koya<br>( <i>Pseudococcus hispidus</i> )  | 4 ml<br>毫升             | 400 ml<br>毫升    | 1000 liter<br>公升                           | 3 kali<br>semusim<br>每季3次                  |

Jangan kutip hasil tanaman koko, sawit sekurang-kurangnya 7 hari selepas semburan terakhir dan 14 hari bagi tanaman durian.

在最后一次施喷农药的7天内，不可收採可可，油棕；榴蓮則14天。