

Alverde® 

Perosak akan mati
akibat berhenti makan
让害虫停食至死




- Ulat akan henti makan selepas 12 jam disembur racun.
害虫食用经喷射过的叶片，在12小时后害虫就会停止取食。
- Ulat akan mati selepas 3 hingga 4 hari.
3至4天后，害虫逐渐死亡。

BASF
We create chemistry

Alverde® 

Perosak akan mati
akibat berhenti makan
让害虫停食至死

Alverde®  ialah racun serangga daripada kumpulan semicarbazone bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.

Alverde®  是一种属于semicarbazone类的杀虫剂，以触摸与胃毒对抗害虫。

TANAMAN 作物	SERANGGA PEROSAK 害虫	KADAR RACUN 用药量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公顷喷液量	BILANGAN SEMBURAN MAKSIMUM 喷射最高次数
		10 LITER AIR 10公升水	SEHEKTAR 每公顷		
Kubis 包菜	Ulat 'Plutella' 吊丝虫 (<i>Plutella xylostella</i>)	15 ml/ 毫升	1200 ml/ 毫升	1000	4 kali semusim 每季4次
	Ulat Kubis 包菜青虫 (<i>Pieris rapae</i>)	12 ml/ 毫升			
	Kabuh Lenteng 叶蚤 (<i>Phyllotreta sinuata</i>)	12 ml/ 毫升			
Tomato 番茄	Pengorek Buah 蛀果虫 (<i>Helicoverpa armigera</i>)	12 ml/ 毫升	1200 ml/ 毫升	1000	3 kali semusim 每季3次
Jagung 玉蜀黍	Pengorek Buah 蛀果虫 (<i>Helicoverpa armigera</i>)	13.5 ml/ 毫升	1350 ml/ 毫升	1000	2 kali semusim 每季2次

Jangan kutip hasil tanaman tomato sekurang-kurangnya 3 hari selepas semburan terakhir dan 7 hari bagi kubis dan jagung.

最后一次喷射此药剂后，至少在3天内不可采收番茄；7天内不可采收包菜与玉蜀黍。

有效控制吊丝虫，包菜青虫，叶蚤及蛀果虫。
Berkesan untuk mengawal Ulat Plutella,
Ulat Kubis, Kabuh Lenteng dan Pengorek Buah.

Alverde® 

