

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK

# ZAMPRO® DM

控制抗药性, 防病用



**全新一代杀菌剂**

**BASF**  
We create chemistry

# ZAMPRO® DM

控制抗药性, 防病用

## 控制晚疫病 - 蕃茄 Kawalan Hawar Phytophthora - Tomato

ZAMPRO® DM ialah racun kulat Oomycete apabila *dimethomorph* bertindak dengan memecahkan pembentukan dinding sel pada peringkat pertumbuhan kulat. Ametoctradin bertindak terhadap spora dan seterusnya melindunginya daripada serangan penyakit.

**ATURAN PENGGUNAAN:** Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

ZAMPRO® DM是一种属于卵菌纲的杀菌剂, 以对抗在成长中的菌类破坏其细胞壁的形成。Ametoctradin 则对孢子给予保护作用以防止病害。

使用方法: 未依照标签指示使用是犯法的。

TANAMAN 农作物	PENYAKIT 病害	KADAR RACUN 用药量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公顷喷液量	BILANGAN SEMBURAN MAKSIMUM 每季最高喷射次数
		10 LITER AIR 10公升水	SEHEKTAR 每公顷		
Tomato 蕃茄	Hawar Phytophthora 晚疫病 ( <i>Phytophthora infestans</i> )	8ml / 毫升	800ml / 毫升	1000 liter / 公升	3 kali semusim 每季三次
Timun 黄瓜	Kulupuk Downy 露菌病 ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	8ml / 毫升	800ml / 毫升	1000 liter / 公升	3 kali semusim 每季三次

Jangan kutip hasil tanaman tomato sekurang-kurangnya 3 hari selepas semburan terakhir dan 7 hari bagi timun. 最后一次喷药后, 至少3天内不可采收蕃茄, 而黄瓜是7天。



Buah tomato yang diserang  
被病擊的蕃茄



Buah tomato yang dirawat dengan ZAMPRO® DM  
berdasarkan nisbah 8ml/ 10L  
以8毫升/10公升比率使ZAMPRO® DM用治疗蕃茄

Didaftarkan oleh:

**BASF (Malaysia) Sdn. Bhd.** (182671-M)  
No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

**BACA LABEL SEBELUM GUNA**

JIRP.E/0822/513