


INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK

PROWL® CS

RACUN RUMPAI PRA-CAMBAH BAHARU
DENGAN FORMULASI MICROENKAPSULASI

擁有微囊化配方的
新萌芽前殺草劑



BASF

We create chemistry

PROWL® CS

RACUN RUMPAI PRA-CAMBAH BAHARU DENGAN FORMULASI MICROENKAPSULASI

擁有微囊化配方的
新萌芽前殺草劑




PROWL® CS ialah racun rumpai pra-cambah daripada kumpulan 'dinitroaniline' yang bertindak secara selektif.

ATURAN PENGGUNAAN/使用說明：

Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan.

KAWASAN TANAMAN 農作物區	RUMPAI 雜草	KADAR RACUN 用藥量		CATATAN 備註
		10 Liter Air 公升水	Sehektar 每公頃	
Sawi 菜心 (yang disemai 已種植)	Jelamparan 升馬唐 (<i>Digitaria adscendens</i>)	9 ml/毫米 PROWL® CS	400 ml/毫米 PROWL® CS	Gunakan dalam jangka masa 2-3 hari selepas menyemai. 種植2至3天後才 使用。
	Bayam Duri 刺莧 (<i>Amaranthus spinosus</i>)			Gunakan 0-2 hari sebelum menyemai. Elakkan tanah atas jatuh ke dalam lubang tanaman semasa menyemai. 種植0至2天前才使 用。種植時，避免上 面的泥土掉落到種植 用的小洞。
Kubis Bulat 包菜, Tomato 番茄 (yang diubah 改良後)	Gelang Pasir 馬齒莧 (<i>Portulaca oleracea</i>) Rumput Sambau 牛筋草 (<i>Eleusine indica</i>)	30 ml/毫米 PROWL® CS	1.3 liter/公升 PROWL® CS	



Isi padu semburan: 450 liter/ hektar.



BACA LABEL SEBELUM GUNA

JIRP.P/0419/094